

Algunos fármacos que pueden inducir pesadillas:

Antiretrovirales:

Efavirenz (Sustiva®)

Antibioticos:

Ciprofloxacina (Globuce®)

Antidepresivos:

Inhibidores de recaptacion de serotonina

Fluoxetina (Prozac®, Adophen®)

Duloxetina (Cymbalta®)

Venlafaxina (Dobupal®, Vandal®)

Paroxetina (Seroxat®)

Escitalopram (Cipralex®)

Citalopram (Prisdal®, Seropram®)

Mirtazapina (Rexer®)

Antidepresivos tricíclicos

Amitriptilina (Anafranil®, Nobritol®)

Imipramina (Tofranil®)

Bupropion (Zyntabac®; Elontril®)

Antihistamínicos:

Dexclorfeniramina (Polaramine®)

Difenidramina (Soñodor®, Benadryl®)

Prometacina (Fernegan®)

Hidroxicina (Atarax®)

Antiepilépticos:

Fenobarbital (Luminal®)

Clonazepam (Rivotril®)

Valproato (Depakine®)

Potenciadores cognitivos:

Donezepilo (Aricept®)

Risperidona (Risperdal®)

Rivastigmina (Exelon®)

Cardiología:

Beta-bloqueantes

Atenolol (Tenormin®)

Propanolol (Sumial®)

Bloqueantes de los canales de calcio

Losartán (Cozaar®)

Felodipino (Plendil®)

Inhibidores ACE

Losartán (Enalapril®)

Analgésicos y opiáceos:

Naproxeno®

Ketamina ®

Morfina®

Antiparkinsonianos Y S. Piernas Inquietas:

Amantadina
L-Dopa (Sinemet®, Madopar®)
Ropinirol (Requip®, Adrartrel®)
Pramipexol (Mirapexin®)
Cabergolina (Sogilen®)
Rotigotina (Neupro®)

Antipsicóticos:

Clozapina (Leponex®)
Risperidona (Risperdal®)
Olanzapina (Zyprexa®)

Hipnóticos:

Temazepam (Remestán®)
Triazolam (Halcion®)
Lormetacepam (Noctamid®)
Zolpidem (Stilnox®)
Zopiclona (Limovan)

Deshabituación tabáquica:

Vareniciclina (Chantix®)
Parches de nicotina
Bupropion (Zyntabac®)

Estatinas:

Atorvastatina (Lipitor®)
Simvastatina (Zocor®)
Rosuvastatina (Cresor®)

TDAH, Narcolepsia:

Metilfenidato (Rubifén®, Concerta®)
Dexantetamina (no disponible en España)